

**Dr. Norberto Quispe López**

**Equipo: Dra. Irene Mendoza García / Don Francisco José Báez Pacheco**

**Clínica privada, Salamanca**




**Reconstrucción alveolar y cirugía endodóntica.**



**OsteoBiol Apatos, OsteoBiol Lámina cortical curva, Tornillos Tekka y Safescraper.**

**Descripción del caso:** paciente mujer, no fumadora que acude a consulta para rehabilitación implantológica en diente #11. Nos explica haber sufrido un traumatismo hace muchos años el cual fue tratado y retratado en diferentes épocas. A la exploración clínica y radiográfica, observamos recesión gingival localizada en diente #11, leve tumefacción en la zona y molestias. Tras estudio tomográfico, podemos definir el defecto como tipo III según la clasificación propuesta por Elian y Cols. ("pérdida completa del hueso vestibular más recesión gingival"). En el diente #12 observamos una lesión periapical radiolúcida circunscrita (periodontitis apical crónica persistente). El plan de tratamiento incluye la extracción de diente #11 junto al uso del PRGF con el objetivo de fomentar la cicatrización del tejido blando (angiogénesis).





Tras 4 semanas, realizar la colocación temprana de implante Mis V3 3.90 13mm más regeneración ósea guiada junto a la cirugía endodóntica en diente #12.



1. Evaluación del CBCT.
2. Exploración clínica inicial.
3. Extracción de diente 11 más colocación de PRGF.
4. Imagen intraquirúrgica a las 4 semanas de la extracción.
5. Sellado de la retroparación, más estabilización y fijación de la Membrana cortical curva con los tornillos Tekka.
6. Colocación de implantes.
7. Regeneración ósea con hueso autógeno.

**Continúa en siguiente página**

# CASO CLÍNICO DESTACADO NOVIEMBRE 2018



8. Colocación de OsteoBiol Apatos y fijación de Membrana cortical curva.

9. Reentrada quirúrgica a los 6 meses.

10. Fase de acondicionamiento de los tejidos blandos.

11. Imagen intraquirúrgica durante el proceso de perfilado del perfil de emergencia.

12. Radiografía periapical en diferentes momentos del tratamiento.

13. Momento de la entrega.

14. Seguimiento radiográfico tras 11 meses.

15. Comparación tomográfica.

16. Fotografía final tras 13 meses de evolución.

Caso clínico destacado del mes.  
Noviembre de 2018. Osteógenos.